Чёрные монахи

Не так-то просто отыскать гнездо этих лесных отшельников, но даже если вы найдете его — не тревожьте редких птиц.

Белые аисты давно подружились с людьми, свои гнезда они зачастую строят на крышах деревенских домов. А вот их черные собратья предпочитают держаться подальше от человека. Хотя в последнее время участились случаи их гнездования вблизи населенных пунктов — иногда всего в пятистах метрах. Порой они прилетают кормиться на сельскохозяйственные угодья и искусственные водоемы.

Порыбачили — и в лес

“Классические” места обитания черных аистов — старые влажные леса по соседству с болотами, долинами рек или заболоченными лугами. Они предпочитают лиственные участки — ольшаники, пойменные дубравы, а также смешанные леса, реже селятся в старых хвойных лесах.

Это гнездящийся перелетный и транзитно мигрирующий вид. В Беларуси черные аисты объявляются в конце марта — апреле. Гнезда строят в кронах старых деревьев на высоте от 3,5 до 26 м. Описаны случаи гнездования на стоге сена, земле, настилах для ульев, расположенных на деревьях. Охотно заселяют и специальные искусственные платформы.

Гнезда черные аисты сооружают из веток. Лоток выстлан сухой травой, кусками дерна, иногда мхом с примесью листьев и шерсти. Гнездо используется в течение ряда лет, иногда с перерывами, постоянно достраивается и порой достигает значительных размеров. Одна пара может иметь по два гнезда на расстоянии 150—1000 м одно от другого и занимать их поочередно. Края жилого гнезда и лесная подстилка под ним всегда известково-белые от экскрементов — этим оно отличается от гнезд хищных птиц.

В кладке от 2 до 6 белых яиц размером 65,3—47,2 мм. Насиживают их обе птицы в течение 32—38 суток. Птенцы окончательно покидают гнездо на 70—75-е сутки.

Кормятся черные аисты преимущественно рыбой, реже — земноводными и беспозвоночными. Осенняя миграция начинается с конца июля и проходит до сентября. Места зимовок расположены в Африке.

Охранные меры дают результат

С конца XIX века черный аист описывается в литературе как немногочисленный или редкий вид, хотя и широко распространенный, особенно на юге Беларуси. Во второй половине прошлого столетия он был отнесен к видам, численность которых сокращается катастрофически быстро. Однако с начала 1980-х годов во многих регионах и в целом по Беларуси регистрируется рост численности этого вида и ее стабилизация.

Сейчас численность черного аиста в Беларуси оценивается в 950—1300 пар — это не менее 15 процентов мировой популяции вида. Плотность гнездования составляет в среднем по Беларуси 1,4 пары на 100 км2 площади, покрытой лесом. Рост численности в последние годы связан с усилением охраны вида, улучшением гнездовых и кормовых условий: увеличились лесистость территории и протяженность мелких водотоков в результате мелиорации, стало больше рыбхозов, а соответственно и искусственно зарыбленных водоемов.

Среди основных факторов, представляющих угрозу этому виду, специалисты называют вырубку старых лесов, уничтожение гнезд при сплошных рубках, беспокойство в период гнездования, браконьерский отстрел птиц. Известны случаи резкого локального падения численности из-за осушения или, наоборот, переувлажнения мест обитания.

Черный аист занесен в Красную книгу Республики Беларусь с 1981 года. Росту его численности способствует выделение охранных зон радиусом до 250 м вокруг выявленных гнезд. При проведении рубок рекомендуется сохранять отдельные деревья или их группы на перспективных для гнездования территориях.

Сохранению этого вида уделяется большое внимание на международном уровне. Внесен он в Красные книги и наших стран-соседей — Литвы, Латвии, России, Украины.

Черный аист (Ciconia nigra) относится к семейству аистовых, он незначительно уступает по размерам своему белому собрату. Это довольно крупная птица: длина тела достигает 1 м, масса — 3 кг. Шея и ноги длинные. В полете шея вытянута. Окраска оперения черная с металлическим блеском, белые только брюхо и подхвостье. Клюв и ноги красные, у молодых птиц — оливковые.

Источник: Родная прырода.-2010.-№ 7.-С.64-65.